

DEGRAIS' DESINFECTANT ALIMENTAIRE HP



DEFINITION / DESTINATION / REFERENCES

Dégraissant désinfectant des surfaces alimentaires sans chlore. P.O.A - P.O.V.

Homologué par le Ministère de l'Agriculture sous le n° 2030363.

Bactéricide à la dose de 0,5 et 1 % (en 5 min à 20°C) pour l'élevage et IAA.

Fongicide à la dose 2 et 3 % (en 15 min à 20°C) en IAA.

Virucide selon la norme NF EN 13610 à la dose de 0,5 à 4 % (en 15 min à 20°C) sur les bactériophages.

Virucide selon la norme NF EN 14476 à la dose de 3 % (en 60 min à 20°C) sur polyovirus, adénovirus, influenza virus (H1N1 grippe A, H5N1 grippe aviaire), hépatite B et C, HIV, rotavirus (gastro entérite), virus Herpès simplex.

Produit à fort pouvoir dégraissant et émulsifiant assurant un parfait nettoyage du matériel.

- référence HYD010122 - 5 l

MISE EN ŒUVRE / AVANTAGES

- Secteur de la transformation alimentaire artisanale et métiers de bouche : abattoirs, boucheries, charcuteries, plats préparés, traiteurs, boulangeries, pâtisseries ...
- S'utilise sur tous supports, sols, murs, chambres froides, tables, appareils de découpe, hottes, caissons d'aération.

Matériel	Concentration	Température	Temps de contact
Appareil générateur de mousse ou en pulvérisation	2 à 4 %	Ambiante et jusqu'à 50°C	5 à 15 minutes

- Effectuer un pré-rinçage et utiliser le produit à dose adéquate.
- Frotter puis rincer ensuite avec de l'eau potable.
- Dose pour un traitement bactéricide = 0,5 et 1 % pour le domaine de l'élevage.
- Dose pour un traitement fongicide = 3 % pour le domaine de l'élevage et 2 % en IAA.

DEGRAIS' DESINFECTANT ALIMENTAIRE HP



DOMAINES D'APPLICATION

- Production animale : logements, matériel de transport et d'élevage.
- Industrie alimentaire : préparation et transport de la nourriture des animaux domestiques, récolte, transport, stockage, transformation industrielle et commercialisation des produits d'origine animale et végétale.
- Production végétale : locaux de stockage, matériel de stockage, matériel de transport.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide limpide jaune brun
- Densité : 1,07 +/- 0,02
- Stockage : Conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
- Matière active : Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N° CAS : 7173-51-5) à 37,275 g/l.
- Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) : Didecyldimonium chloride, limonene, parfum.
- pH 1 % : 11,5 +/- 0,5
- Pouvoir moussant : Moussant (en appareil générateur de mousse)
- Inférieur à 5 % : EDTA. 5 % ou plus, mais moins de 15 % : agent de surface non ionique.

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

- Efficacité bactéricide selon la norme AFNOR EN 1276 en condition de propreté

Souches d'essai	Concentration minimale bactéricide
Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467	0,50%
Escherichia coli CIP 54.127	0,50%
Staphylococcus aureus CIP 4.83	0,50%
Enterococcus hirae CIP 58.55	0,50%

La concentration minimale bactéricide est de 0,5 % selon la norme AFNOR EN 1276 en 5 minutes de contact à 20°C dans les conditions de propreté (0,3 g/l albumine bovine).

- Efficacité bactéricide selon la norme AFNOR EN 1276 en condition de saleté

Souches d'essai	Concentration minimale bactéricide
Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467	1,00%
Escherichia coli CIP 54.127	0,75%
Staphylococcus aureus CIP 4.83	0,75%
Enterococcus hirae CIP 58.55	0,75%

La concentration minimale bactéricide est de 1 % selon la norme AFNOR EN 1276 en 5 minutes de contact à 20°C dans les conditions de saleté (3 g/l albumine bovine).

DEGRAIS' DESINFECTANT ALIMENTAIRE HP

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES (suite)

- Efficacité bactéricide selon la norme AFNOR EN 1276 en condition de saleté

Souches d'essai	Concentration minimale bactéricide
Salmonella typhimurium	0,50%
Listeria monocytogenes	0,50%

La concentration minimale bactéricide est de 0,5 % selon la norme AFNOR EN 1276 en 5 minutes de contact à 20 °C dans les conditions de saleté (3 g/l albumine bovine).

- Efficacité fongicide selon la norme AFNOR EN 1650 en condition de saleté

Souches d'essai	Concentration minimale fongique
Aspergillus niger CIP 1431.83	2,00%
Candida albicans CIP 1180.79	2,00%

La concentration minimale fongicide est de 2 % selon la norme AFNOR EN 1650 en 15 minutes de contact à 20 °C dans les conditions de saleté (3 g/l albumine bovine).

- Efficacité bactéricide selon la norme NF T 72 170 en eau dure 30°TH et matières organiques (1 % extrait de levure + 1 % albumine bovine)

Souches d'essai	Concentration minimale bactéricide	
	Eau dure 30° TH	Matières organiques
Pseudomonas aeruginosa CIP A 22	0,50%	0,50%
Escherichia coli CIP 54.127	0,50%	0,50%
Staphylococcus aureus CIP 53.154	0,50%	0,50%
Enterococcus hirae CIP 58.55	0,50%	0,50%

La concentration minimale bactéricide est de 0,5 % selon la norme NF T 72 170 en 5 minutes de contact à 20 °C en présence d'eau et de matières organiques.

- Efficacité fongicide selon la norme NF T 72 300 en eau dure 30°TH

Souches d'essai	Concentration minimale fongique
Absidia corymbifera IP 1129.75	2,00%
Aspergillus versicolor IP 1187.79	3,00%
Cladosporium cladosporioides IP 1231.80	3,00%

La concentration fongicide est de 3 % selon la norme NF T 72 300 en 15 minutes de contact à 20 °C en présence d'eau et de matières organiques.

DEGRAIS' DESINFECTANT ALIMENTAIRE HP

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES (suite)

- Efficacité virucide selon la norme NF EN 13610 en présence de petit-lait acide

Condition requise : 15 minutes à 20° C

Substance interférence : en présence d'une fraction volumique de 1 % de petit-lait acide

Bactériophages de référence	Activité virucide
Bactériophage MS 2 et Escherichia coli Hfrh	= à 1,0 %
Bactériophage T2 et Escherichia coli B	< ou = à 0,5 %
Bactériophage Φ X 174 et Escherichia coli ATCC 13706	= à 4,0 %
Bactériophage lactique n° 66 et Streptococcus lactis diacetylactis IL 561	< ou = à 0,5 %

Conformément à la norme NF EN 13610 et aux conditions expérimentales définies, le produit, dilué dans l'eau dure et en présence d'une fraction volumique de 1 % de petit-lait acide, présente une activité virucide vis-à-vis des quatre bactériophages, après un temps de contact de 15 minutes à 20° C.

Conformément à la norme NF EN 13610 et aux conditions expérimentales définies, le produit, dilué dans l'eau dure et en présence d'une fraction volumique de 1 % de petit-lait acide, présente une activité virucide après un temps de contact de 15 minutes à 20° C sur le bactériophage de référence P008 (DSM 10567) lythique pour Lactococcus lactis sous espèce lactris F7/2 (DSM 4366) à une concentration < ou = à 1 % (V/V).

- Efficacité virucide selon la norme NF EN 14476 en condition de saleté

Souches d'essai	Activité virucide
Polyovirus type 1	3,00%
Adénovirus type 5	

La concentration minimale virucide est de 3 % selon la norme NF EN 14476 en 60 minutes de contact à 20° C dans les conditions de saleté (3 g/l albumine bovine).



FORMULAIRE

FTHYG-0448

Indice :

Révision : 01/02/2015

FICHE TECHNIQUE

Page 5 sur 5

DEGRAIS' DESINFECTANT ALIMENTAIRE HP



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Produit strictement professionnel.
- Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N° 0710) : + 33 (0)3 83 32 36 36.
- N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33(0)1 45 42 59 59.
- Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.
- Ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

Produit conforme au règlement CE 889/2008, pour le nettoyage et la désinfection des installations utilisées pour les produits de l'agriculture biologique.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.