DÉGRAIS' DÉSINFECTANT ALIMENTAIRE HP EVO

FICHE TECHNIQUE

À DILUER | CONTACT ALIMENTAIRE | pH 11

FONGICIDE EN 13697, EN 1650 | BACTÉRICIDE EN 1276, EN 13697 | LÉVURICIDE EN 1650, EN 13697 | VIRUCIDE EN 14476, EN 16777

DÉFINITION / DESTINATION

Détergent dégraissant désinfectant alcalin, sans chlore actif, des surfaces alimentaires (et non alimentaires).
Produit à fort pouvoir dégraissant et émulsifiant assurant un parfait nettoyage du matériel.
S'utilise en pulvérisation, en application mousse sur toutes les surfaces (1) : sols, murs, portes, chambres froides, tables, appareil de découpe, hottes, caissons d'aération....

Destination : Secteur de la transformation alimentaire artisanale et métiers de bouche (boucheries, charcuteries, plats préparés, traiteurs, boulangeries, pâtisseries, …).
Industries agroalimentaires (préparation et transport de la nourriture des animaux domestiques, récoltes, transports, stockages, transformations industrielles et commercialisation des produits d'origine animale et végétale, locaux de stockage, matériel de stockage, matériel de transport).
Utilisable également en industrie cosmétique.

(1) faire un test au préalable sur une surface non visible, avec le plus grand dosage et le plus long temps de contact.

PROPRIÉTÉS

- Bactéricide
- Levuricide
- Fongicide
- Virucide

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide limpide Pouvoir moussant (en utilisation avec appareil générateur de mousse).
Couleur	Incolore à jaunâtre
pH (±)	11 (± 0,5)
Densité à 20°C ≈ (g/cm3)	1,085 (± 0,015)
Substances Actives	BENZALKONIUM CHLORIDE [ADBAC/BKC (C12-C16)](N°CAS : 68424-85-1) à 50 g/Kg.
Composition	Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) n°648/2004) : consulter la rubrique 15 de la FDS. La formule répond au règlement (CE) n°528/2012 des produits biocides.
Solubilité	SL - Concentré soluble
Contact Alimentaire	Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire.
Conditionnement	5L - référence : 0347065212
Stockage / Conservation	Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.

MODE D'EMPLOI

Méthode d'application / Mode d'emploi	Avant tout nettoyage, procéder au rangement et balayage. Effectuer un pré-rinçage puis utiliser le produit à la dose adéquate. Laisser agir le temps nécessaire selon l'action désinfectante recherchée. Rinçage obligatoire à l'eau froide potable. Pour des actions spécifiques et ciblées en fonction de votre secteur d'activité et de vos protocoles internes, consulter les tableaux d'activités microbiologiques en fin de document.
Matériel d'application	Appareil générateur de mousse ou pulvérisateur.
Dosage	0,25% à 5% selon secteur d'activité et protocoles. (voir tableaux d'activités microbiologiques en fin de document).
Température	20°C - 40°C (voir tableaux d'activités microbiologiques en fin de document)
Temps de contact	5 à 30 min (voir tableaux d'activités microbiologiques en fin de document).
Rinçage	Rinçage obligatoire à l'eau froide potable.

NORMES ET LÉGISLATION

DETERGENT DESINFECTANT - HYGIENE ET DESINFECTION
USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL
TP02 : Désinfectants pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.
TP04 : Désinfectants pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier en contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

PRÉCAUTIONS / INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES

En cas d'inefficacité, veuillez remonter le problème au détenteur de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) : infobiocide@b2f.fr.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Formule (N°0700) déposée au centre antipoison européen (PCN).
N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ ORFILA : + 33 (0) 1 45 42 59 59.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hygienedoc.fr.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Activités microbiologiques Bactéricide en conditions de saleté (albumine bovine à 3 g/l).
(*) à 10°C en condition de saleté (albumine bovine à 3 g/l + érythrocytes de moutons 3 mL/L).

Efficacité Bactéricide

pour plus de détails, consulter le tableau ci-dessous

1%	20°C	15 minutes
3%	10°C (*)	15 minutes
0,25%	40°C	5 minutes

Efficacité	Norme	Souches d'essai	Dosage	T°C	Temps de contact
Bactéricide	EN 1276 EN 13697	*Pseudomonas aeruginosa* *Escherichia coli* *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae*	2%	**20°C**	5 min
		Souches additionnelles *Listeria monocytogenes* *Salmonella enterica*	1%		
		Pseudomonas aeruginosa *Escherichia coli* *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae* *Listeria monocytogenes* *Salmonella enterica*	**1%**		**15 min**
		Pseudomonas aeruginosa *Escherichia coli* *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae*	**3%**	**10°C**	**15 min**
		Souches additionnelles *Listeria monocytogenes* *Salmonella enterica*	1%		
		Souches obligatoires *Enterococcus faecium*	**0,25%**	**40°C**	**5 min**
		Souches additionnelles *Listeria monocytogenes* *Salmonella enterica*	0,10%		

Activités microbiologiques Levuricide en conditions de saleté (albumine bovine à 3 g/l).

(*) à 10°C en condition de saleté (albumine bovine à 3 g/l + érythrocytes de moutons 3 mL/L).

Efficacité Levuricide
pour plus de détails, consulter le tableau ci-dessous

1%	20°C	5 minutes
2%	10°C (*)	15 minutes
0,50%	40°C	5 minutes

Efficacité	Norme	Souches d'essai	Dosage	T°C	Temps de contact
Levuricide	EN 1650 EN 13697	*Candida albicans*	1%	20°C	5 min
			0,50%		15 min
			2%	10°C	15 min
			0,50%	40°C	5 min

Activités microbiologiques Fongicide en conditions de saleté (albumine bovine à 3 g/l).

Efficacité Fongicide
pour plus de détails, consulter le tableau ci-dessous

4%	20°C	30 minutes
2,50%	40°C	15 minutes

Efficacité	Norme	Souches d'essai	Dosage	T°C	Temps de contact
Fongicide	EN 1650 EN 13697	*Aspergillus brasiliensis*	5%	20°C	15 min
			4%		30 min
			2,5%	40°C	15 min

Activités microbiologiques Virucide en conditions de saleté (albumine bovine à 3 g/l).

Efficacité Virucide
pour plus de détails, consulter le tableau ci-dessous

3%	20°C	30 minutes

Efficacité	Norme	Souches d'essai	Dosage	T°C	Temps de contact
Virucide	EN 14476	*Adenovirus* *Norovirus murin* *Poliovirus*	3%	20°C	30 min
	EN 16777	*Adenovirus* *Norovirus murin*			

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette du produit.